

Q2. De voorgaande zes vragen die gesteld zijn gingen over gevoelens die mogelijk voorgekomen zijn in de afgelopen 30 dagen. Ze allemaal samen nemend, kwamen deze gevoelens vaker dan normaal is voor u, voor in de afgelopen 30 dagen, ongeveer hetzelfde, of minder vaak dan normaal? (Als u deze gevoelens nooit heeft, omcirkel dan optie “4.”)



De volgende paar vragen gaan over hoe deze gevoelens u mogelijk hebben beïnvloedt in de afgelopen 30 dagen. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden als u “Nooit” heeft geantwoord op **alle** zes vragen over uw gevoelens.

Q3. Gedurende de afgelopen 30 dagen, hoeveel dagen van de afgelopen 30 was u totaal niet in staat om te werken of uw normale bezigheden uit te voeren als gevolg van deze gevoelens?

_____ (Aantal dagen)

Q4. De dagen die u in Q3 hebt gerapporteerd niet meetellend, hoeveel dagen van de afgelopen 30, was u in staat om slechts de helft of minder te doen dan waar u normaal gesproken toe in staat zou zijn, als gevolg van deze gevoelens?

_____ (Aantal dagen)

Q5. Gedurende de afgelopen 30 dagen, hoe vaak ging u naar een dokter of andere gezondheidszorgmedewerker voor deze gevoelens?

_____ (Aantal keer)

| | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Altijd | Meest al | Af en toe | Soms | Nooit |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|

Q6. Gedurende de afgelopen 30 dagen, hoe vaak waren lichamelijke gezondheidsproblemen de belangrijkste oorzaak van deze gevoelens?

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

Binding margin – do not write

© Ronald C. Kessler, PhD. 2006

All rights reserved. Based on the Composite International Diagnostic Interview © 2001 Ronald C. Kessler, PhD. All rights reserved. Used with permission. Requests for permission to reproduce or translate — whether for sale or for noncommercial distribution—should be addressed to Professor Ronald Kessler, PhD, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, (fax: +011 617-432-3588; email: ronkadm@hcp.med.harvard.edu).

Acknowledgements

Translation of this document was performed on behalf of the Composite International Diagnostic Interview Advisory Committee by J. Hans Ormel, PhD, of the University of Groninge, Netherlands, and Ron de Graaf, PhD, and Martine Buist-Bouwman, PhD, of Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos Institute), Utrecht, Netherlands.